

## ESTADÍSTICAS MUNDIALES SOBRE EL VIH

---

19,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 2016.

36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el mundo.

1,8 millones [1,6 millones–2,1 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.

1 millón [830.000–1,2 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.

76,1 millones [65,2 millones–88,0 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.

35,0 millones [28,9 millones–41,5 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

---

### Personas que viven con el VIH

- En 2016, 36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] de personas vivían con el VIH.
  - 34,5 millones [28,8 millones–40,2 millones] adultos
  - 17,8 millones [15,4 millones–20,3 millones] mujeres (mayores de 15 años)
  - 2,1 millones [1,7 millones–2,6 millones] niños (menores de 15 años)

### Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica

- En 2016, 19,5 millones [17,2 millones–20,3 millones] de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica, un aumento con relación a los 17,1 millones [15,1 millones–17,8 millones] de 2015 y los 7,7 millones [6,8 millones–8,0 millones] de 2010.
- En 2016, alrededor del 53% [39%–65%] de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento.
  - Aproximadamente el 54% [40%–65%] de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, pero solo el 43% [30%–54%] de los niños de hasta 14 años tuvieron acceso.
- En 2016, alrededor del 76% [60%–88%] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión del VIH a sus hijos.

## Nuevas infecciones por el VIH

- A nivel mundial, 1,8 millones [1,6 millones–2,1 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron alrededor de un 11%, desde 1.9 millones [1,6 millones–2,1 millones] hasta 1,7 millones [1,4 millones–1,9 millones] en 2016.
- Las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 47% desde 2010, desde 300.000 [230.000–370.000] en 2010 hasta 160.000 [100.000–220.000] en 2016.

## Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en un 48%.
  - En 2016, fallecieron 1 millón [830.000–1,2 millones] de personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1,9 millones [1,7 millones–2,2 millones] de 2005 y los 1,5 millones [1,3 millones–1,7 millones] de 2010.

## El VIH y la tuberculosis

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH, y es responsable de aproximadamente una de cada tres muertes relacionadas con el sida.
- En 2015, hubo aproximadamente 10,4 millones de casos de tuberculosis en todo el mundo, donde se incluyen 1,2 millones [11%] de personas que vivían con el VIH.
- Las muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH descendieron un 33% de 2005 a 2015.
  - Sin embargo, aproximadamente un 60% [57%] de los casos de tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH no recibieron ningún diagnóstico o tratamiento, lo que causó 390.000 muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH en 2015.

## Inversiones

- A finales de 2016, había 19.100 millones de dólares estadounidenses disponibles para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medios.
- Los recursos nacionales representaron el 57% del total de los recursos destinados al VIH en dichos países en 2016.
- ONUSIDA estima que se necesitarán 26.200 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020 en los países de ingresos bajos y medios, y 23.900 millones de dólares estadounidenses en 2030.

## ESTADÍSTICA REGIONALES SOBRE EL VIH EN 2016

### África Oriental y Meridional

- En 2016, **19,4 millones** [17,8 millones–21,1 millones] **de personas vivían con el VIH** en África Oriental y Meridional.

- **Las mujeres y las niñas** representan más de la mitad **[59%]** del total de personas que viven con el VIH en África Oriental y Meridional.
- En África Oriental y Meridional se concentra el **43% del número total de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo**.
- En 2016, se produjeron en la región alrededor de **790.000** [710.000–870.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las nuevas **infecciones por el VIH descendieron un 29%** de 2010 a 2016.
- En África Oriental y Meridional, **420.000** [350.000–510.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muerres relacionadas con el sida** en la región experimentó un descenso del **42%**.
- En África Oriental y Meridional, **11,7 millones** de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica, un **60%** [48%–68%] de todas las personas que vivían con el VIH en la región.
  - El **67%** [54%–76%] de las mujeres adultas (mayores de 15 años) y el **51%** [41%–58%] de los hombres adultos tenían acceso a la terapia antirretrovírica en África Oriental y Meridional en 2016.
  - **Seis de cada diez personas** que reciben terapia antirretrovírica viven en África Oriental y Meridional.
- En 2016, se produjeron **77.000** [52.000–110.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en África Oriental y Meridional.
  - Desde 2010, se ha producido un descenso del **56%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

### Asia y el Pacífico

- En 2016, **5,1 millones** [3,9 millones–7,2 millones] de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **270.000** [190.000–370.000] nuevas infecciones por el VIH.
  - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **13%** de 2010 a 2016.
- En Asia y el Pacífico, **170.000** [130.000–220.000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muerres relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso del 30%**.
- La cobertura del tratamiento llegó al **47%** [31%–69%] de las personas que vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- Aproximadamente **2,4 millones** [2,1 millones–2,5 millones] de personas tuvieron **acceso a la terapia antirretrovírica** en Asia y el Pacífico en 2016.
- En 2016, se produjeron **15.000** [7.700–26.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en Asia y el Pacífico.

- Desde 2010, se ha producido un descenso del **38%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

### África Occidental y Central

- En 2016, **6,1 millones** [4,9 millones–7,6 millones] **de personas vivían con el VIH** en África Occidental y Central.
  - **Las mujeres** representan el **56%** del total de personas que viven con el VIH en la región.
- En 2016, se produjeron en la región alrededor de **370.000** [270.000–490.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las **nuevas infecciones por el VIH descendieron** un **9%** de 2010 a 2016.
- En África Occidental y Central, **310.000** [220.000–400.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un **descenso** del **21%**.
- En África Occidental y Central, **2,1 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica**, un **35%** [24%–44%] de todas las personas que vivían con el VIH en la región.
- En 2016, se produjeron **60.000** [35.000–89.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en África Occidental y Central.
  - Desde 2010, se ha producido un **descenso del 33% del número de nuevas infecciones por el VIH en niños** en la región.

### América Latina

- En 2016, **1,8 millones** [1,4 millones–2,1 millones] **de personas vivían con el VIH** en América Latina.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **97.000** [79.000–120.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - El número de nuevas infecciones por el VIH no varió de 2010 a 2016.
- En América Latina, **36.000** [28.000–45.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el **número de muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso** del **12%**.
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 llegó al **58%** [42%–72%] de todas las personas que vivían con el VIH en América Latina.
- En 2016, se produjeron **1.800** [1.300–2.400] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en América Latina.

### El Caribe

- En 2016, **310.000** [280.000–350.000] personas vivían con el VIH en el Caribe.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **18.000** [15.000–22.000] **nuevas infecciones por el VIH**.

- En 2016, **9.400** [7.300–12.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en el Caribe.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muerres relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso** del **28%**.
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 llegó al **52%** [41%–60%] de todas las personas que vivían con el VIH en el Caribe.
- En 2016, se produjeron **menos de 1.000** [<1.000–1.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en el Caribe.

#### **Oriente Medio y África Septentrional**

- En 2016, **230.000** [160.000–380.000] **personas vivían con el VIH** en Oriente Medio y África Septentrional.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **18.000** [11.000–39.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las **nuevas infecciones por el VIH descendieron un 4%** de 2010 a 2016.
- En Oriente Medio y África Septentrional, **11.000** [7.700–19.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, **el número de muerres relacionadas con el sida en la región experimentó un aumento del 19%**.
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 fue solo del **24%** [15%–41%] de todas las personas que vivían con el VIH en Oriente Medio y África Septentrional.
- En 2016, se produjeron **1.400** [<1.000–3.300] nuevas infecciones por el VIH en niños en Oriente Medio y África Septentrional.

#### **Europa Oriental y Asia Central**

- En 2016, **1,6 millones** [1,4 millones–1,7 millones] **de personas vivían con el VIH** en Europa Oriental y Asia Central.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **190.000** [160.000–220.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - **La cantidad de nuevas infecciones por el VIH ascendió un 60%** de 2010 a 2016.
- En Europa Oriental y Asia Central, **40.000** [32.000–49.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
- Entre 2010 y 2016, el número de **muerres relacionadas con el sida** en la región experimentó un **aumento** del **27%**.
- La cobertura del tratamiento llega solo al **28%** [22%–32%] de las personas que viven con el VIH en Europa Oriental y Asia Central.

#### **Europa Occidental y Central, y América del Norte**

- En 2016, **2,1 millones** [2 millones–2,3 millones] **de personas vivían con el VIH** en Europa Occidental y Central, y América del Norte.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **73.000** [68.000–78.000] **nuevas infecciones por el VIH**.

- En Europa Occidental y Central, y América del Norte, **18.000** [15.000–20.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.

Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso del 32%**.

## Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Personas que viven con el VIH</b>	<b>27,7 millones</b> [23,2 millones–32,3 millones]	<b>31,0 millones</b> [26,0 millones–36,3 millones]	<b>33,2 millones</b> [27,6 millones–39,2 millones]	<b>34,3 millones</b> [28,5 millones–40,3 millones]	<b>34,9 millones</b> [29,0 millones–40,9 millones]	<b>35,5 millones</b> [29,5 millones–41,6 millones]	<b>36,1 millones</b> [30,2 millones–42,2 millones]	<b>36,7 millones</b> [30,8 millones–42,9 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (total)</b>	<b>3,0 millones</b> [2,6 millones–3,4 millones]	<b>2,5 millones</b> [2,2 millones–2,8 millones]	<b>2,2 millones</b> [1,9 millones–2,4 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,8 millones–2,3 millones]	<b>2,0 millones</b> [1,7 millones–2,3 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9 millones–2,4 millones]	<b>1,9 millones</b> [1,6 millones–2,2 millones]	<b>1,8 millones</b> [1,6 millones–2,1 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (mayores de 15 años)</b>	<b>2,5 millones</b> [2,2 millones–2,9 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,8 millones–2,3 millones]	<b>1,9 millones</b> [1,6 millones–2,1 millones]	<b>1,8 millones</b> [1,6 millones–2,0 millones]	<b>1,8 millones</b> [1,5 millones–2,0 millones]	<b>1,7 millones</b> [1,5 millones–2,20 millones]	<b>1,7 millones</b> [1,5 millones–2,0 millones]	<b>1,7 millones</b> [1,4 millones–1,9 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (hasta 14 años)</b>	<b>460.000</b> [370.000–540.000]	<b>430.000</b> [340.000–510.000]	<b>300.000</b> [230.000–370.000]	<b>270.000</b> [250.000–190.000]	<b>220.000</b> [160.000–280.000]	<b>190.000</b> [130.000–260.000]	<b>170.000</b> [110.000–240.000]	<b>160.000</b> [100.000–220.000]
<b>Muertes relacionadas con el sida</b>	<b>1,5 millones</b> [1,2 millones–1,8 millones]	<b>1,9 millones</b> [1,7 millones–2,2 millones]	<b>1,5 millones</b> [1,3 millones–1,7 millones]	<b>1,3 millones</b> [1,1 millones–1,5 millones]	<b>1,2 millones</b> [1,0 millones–1,4 millones]	<b>1,1 millones</b> [940.000–1,3 millones]	<b>1,1 millones</b> [880.000–1,3 millones]	<b>1,0 millones</b> [830.000–1,2 millones]
<b>Personas con acceso a la terapia antirretrovírica</b>	<b>685.000</b> [600.000–710.000]	<b>2,056 millones</b> [1,8 millones–2,1 millones]	<b>7,7 millones</b> [6,8 millones–8,0 millones]	<b>11,2 millones</b> [9,8 millones–11,6 millones]	<b>13,1 millones</b> [11,6 millones–13,7 millones]	<b>15,1 millones</b> [13,3 millones–15,7 millones]	<b>17,1 millones</b> [15,1 millones–17,8 millones]	<b>19,5 millones</b> [17,2 millones–20,3 millones]
<b>Recursos (en dólares de EE. UU.) disponibles para el VIH (países de ingresos bajos y medios)</b>	<b>4.800 millones*</b>	<b>9.400 millones*</b>	<b>15.900 millones*</b>	<b>18.800 millones*</b>	<b>19.500 millones*</b>	<b>19.200 millones*</b>	<b>19.000 millones*</b>	<b>19.100 millones*</b>

\* Incluye los países de ingresos bajos y medianos según la clasificación de 2012 del Banco Mundial.

\* Incluye los países de ingresos bajos y medianos según la clasificación de 2013 del Banco Mundial.

## Datos regionales de 2016

Región	Personas que viven con el VIH (total)	Nuevas infecciones por el VIH			Muertes relacionadas con el sida (total)	Total de personas con acceso a la terapia antirretrovírica
		Total	Más de 15 años	Hasta 14 años		
África Oriental y Meridional	<b>19,4 millones</b> [17,8 millones–21,1 millones]	<b>790.000</b> [710.000–870.000]	<b>710.000</b> [630.000–790.000]	<b>77.000</b> [52.000–110.000]	<b>420.000</b> [350.000–510.000]	<b>11,7 millones</b> [10,3 millones–12,1 millones]
Asia y el Pacífico	<b>5,1 millones</b> [3,9 millones–7,2 millones]	<b>270.000</b> [190.000–370.000]	<b>250.000</b> [180.000–380.000]	<b>15.000</b> [7.700–26.000]	<b>170.000</b> [130.000–220.000]	<b>2,4 millones</b> [2,1 millones–2,5 millones]
África Occidental y Central	<b>6,1 millones</b> [4,9 millones–7,6 millones]	<b>370.000</b> [270.000–490.000]	<b>310.000</b> [220.000–410.000]	<b>60.000</b> [35.000–89.000]	<b>310.000</b> [220.000–400.000]	<b>2,1 millones</b> [1,9 millones–2,2 millones]
América Latina	<b>1,8 millones</b> [1,4 millones–2,1 millones]	<b>97.000</b> [79.000–120.000]	<b>96.000</b> [78.000–120.000]	<b>1.800</b> [1.300–2.400]	<b>36.000</b> [28.000–45.000]	<b>1,0 millones</b> [896.000–1.059.000]
El Caribe	<b>310.000</b> [280.000–350.000]	<b>18.000</b> [15.000–22.000]	<b>17.000</b> [14.000–21.000]	<b>&lt;1.000</b> [<1.000–1.000]	<b>9.400</b> [7.300–12.000]	<b>162.000</b> [143.000–169.000]
Oriente Medio y África Septentrional	<b>230.000</b> [160.000–380.000]	<b>18.000</b> [11.000–39.000]	<b>17.000</b> [10.000–36.000]	<b>1.400</b> [<1.000–3.300]	<b>11.000</b> [7.700–19.000]	<b>54.400</b> [47.800–56.500]
Europa Oriental y Asia Central	<b>1,6 millones</b> [1,4 millones–1,7 millones]	<b>190.000</b> [160.000–220.000]	<b>190.000</b> [160.000–220.000]	—*	<b>40.000</b> [32.000–49.000]	<b>434.000</b> [382.000–452.000]
Europa Occidental y Central, y América del Norte	<b>2,1 millones</b> [2 millones–2,3 millones]	<b>73.000</b> [68.000–78.000]	<b>72.000</b> [67.000–78.000]	—*	<b>18.000</b> [15.000–20.000]	<b>1,7 millones</b> [1,5 millones–1,7 millones]

\* Las estimaciones no estaban disponibles en el momento de la publicación.



## Terapia antirretrovírica por regiones en 2016

	Porcentaje de adultos (mayores de 15 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de niños (hasta los 14 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de mujeres embarazadas con acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión materno-infantil del VIH
África Oriental y Meridional	61% [49–69%]	51% [37–63%]	89% [71–>95%]
Asia y el Pacífico	47% [31–68%]	40% [25–64%]	35% [17–59%]
África Occidental y Central	36% [25–46%]	22% [13–29%]	50% [36–64%]
América Latina	58% [42–72%]	54% [39–67%]	75% [64–88%]
El Caribe	52% [41–60%]	52% [40–63%]	74% [65–84%]
Oriente Medio y África Septentrional	24% [15–41%]	27% [18–48%]	20% [15–41%]
Europa Oriental y Asia Central	27% [21–31%]	—*	—*
Europa Occidental y Central, y América del Norte	78% [64–87%]	—*	—*
Mundial	54% [40–65%]	43% [30–54%]	76% [60–88%]

\* Las estimaciones no estaban disponibles en el momento de la publicación.

### Contacto

Comunicaciones y Promoción Mundial | +41 22 791 1697 | [communications@unaid.org](mailto:communications@unaid.org)

Más información disponible en [aidsinfo.unaid.org](http://aidsinfo.unaid.org)