

Santiago de Chile, 29 de enero de 2018

Secretariat of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva 10
Switzerland

Re: Informe sombra sobre Chile

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres viviendo con VIH
República de Chile

Estimados miembros del Comité CEDAW,

Nos dirigimos a ustedes en nombre de la organización ICW Latina, Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH SIDA, (ICW Latina) afectos de proporcionar información respecto de la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas viviendo con VIH.

ICW Latina somos una red regional de mujeres que participamos activamente para armonizar los esfuerzos regionales, favorecer el intercambio de información y experiencia, promover la formulación de políticas públicas, que estimulen la movilización de recursos, incidiendo en los tomadores de decisión para garantizar el respeto a nuestros derechos humanos y el acceso a la salud, educación, oportunidades laborales, principalmente en niñas y adolescentes, con equidad de género, en situaciones que afectan nuestra vidas.

Así las cosas, mediante el presente informe, presentaremos la situación que afrontan las mujeres viviendo con VIH en Chile debido, sobre todo, a la falta de acceso a preservativos femeninos en servicios públicos de salud, la falta de acceso a servicios de salud de calidad que les permitan decidir con autonomía sobre su salud sexual y reproductiva.

The following report talks about the unfavourable situation of women by not having access to female condoms in public health centers, to the lack of medical care that women living with HIV are having in public care facilities, which prevents them from having the possibility of a dignified family planning if they choose to.

I. Introducción

En nuestra condición de mujeres y jóvenes chilenas viviendo con VIH, hemos notado que, de entre las barreras a la garantía de nuestros derechos humanos, destacan la falta de acceso a condones femeninos en centros hospitalarios públicos para prevenir de manera adecuada y equitativa nuevos contagios; y a servicios de atención en salud integrales para las mujeres en esta situación y la vulneración de su derecho a decidir cómo ser madres y cuando, creemos que el estado debe darnos las herramientas necesarias para llevar una vida sexual plena y segura.

II. Desarrollo

Las y los jóvenes chilenos, se encuentran más que nunca expuestos a un mayor riesgo de contagio de VIH debido a la falta de políticas públicas adecuadas de detección precoz, educación y diagnóstico.

Según ha señalado públicamente el propio Ministerio de Salud chileno, entre los años 2010 y 2015, los nuevos casos de VIH/Sida entre la población han aumentado en un 66%. Este aumento se concentra en aquella población de entre 20 y 29 años, de los cuales además cerca de un 13% son mujeres. En el 90% de estos casos, la transmisión se produjo por vía sexual¹.

De forma coherente con lo anterior, el Instituto Nacional de la Juventud señaló en el año 2015 que 1 de cada 4 jóvenes, independientemente de su sexo, no habían empleado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual con penetración. Adicionalmente, el 56% de ellos declaró no utilizar ningún método anticonceptivo en caso de tener relaciones sexuales con una persona conocida, el 40% indicó que utilizaban dicho método para prevenir una enfermedad de transmisión sexual y un 31% señaló que utiliza píldoras anticonceptivas con el único propósito de evitar un posible embarazo².

Los datos antes señalados indican que en Chile se está produciendo un enorme aumento en la tasa de nuevos contagios de VIH en la población joven. De hecho, Chile es el país latinoamericano donde más ha aumentado el contagio de VIH³.

¹T13. "Corporación Sida Chile asegura que contagios de vih en jóvenes aumentaron un 66% entre 2010 y 2016", disponible en <http://www.t13.cl/noticia/nacional/corporacion-sida-chile-asegura-contagios-vih-jovenes-aumentaron-66-2010-y-2016>

²Instituto Nacional de la Juventud, año 2015 disponible en http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf

³El País. La epidemia de sida en Chile ataca sobre todo a los jóvenes, 16 de agosto de 2017 disponible en https://elpais.com/internacional/2017/08/16/america/1502846247_874119.html

Ante esta realidad, las mujeres jóvenes viviendo con VIH/sida hemos detectado que, el uso del preservativo femenino constituye un método idóneo y adecuado para que las mujeres podamos decidir libre, autónoma y responsablemente sobre nuestra exposición a relaciones sexuales riesgosas⁴, tal y como la Organización Mundial de la Salud ha señalado⁵.

Por otro lado, hemos detectado que, la falta de horas médicas en el sistema público de salud, afecta negativamente a la adherencia al tratamiento antirretroviral por su parte. De hecho, en muchos centros hospitalarios no hay acceso a los exámenes de carga viral y CD4⁶, determinantes para el monitoreo adecuado de la persona afectada en tanto permiten, por ejemplo, regular o adaptar la medicación antirretroviral, así como que la persona viviendo con VIH se mantenga “indetectable”, lo que al mismo tiempo disminuye las posibilidades de contagio⁷.

Además, el control adecuado de los niveles de ambas variables es una condición *sine quanon* para que las mujeres viviendo con VIH podamos tomar decisiones responsables respecto de cuándo, cómo y con qué frecuencia tener en hijos en tanto influyen directamente en la transmisión vertical del VIH de la mujer al feto⁸.

En definitiva, en Chile no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres viviendo con VIH ya que no existe una agenda médica que permita una planificación familiar adecuada.

III. Recomendaciones

⁴ 24 Horas. “Aumento de VIH en Chile: Así funciona el desconocido condón femenino que ayuda a la prevención”, 9 de agosto de 2017 *disponible en* <http://www.24horas.cl/nacional/aumento-de-vih-en-chile-asi-funciona-el-desconocido-condon-femenino-que-ayuda-a-la-prevencion-2472049>

⁵OMS. Salud sexual y reproductiva, “Preservativo femenino”, *disponible en* http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/female_condom/es/

⁶Las células CD4 (en ocasiones denominadas células-T o células auxiliares) son glóbulos blancos que ayudan a organizar la respuesta del sistema inmunitario frente a las infecciones. El recuento de CD4 es la medición del número de estas células en un milímetro cúbico de sangre. La carga viral es el término empleado para referirse a la cantidad de VIH en sangre. Cuanto más virus haya en ese fluido (y por tanto, mayor sea la carga viral), más rápido disminuirá el recuento de células CD4 y mayor será el riesgo de enfermarse. Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebas *disponible en* https://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf

⁷Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebas, pág. 10 *disponible en* https://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf ver también indetectables. “¿QUÉ SIGNIFICA SER “INDETECTABLE?”, *disponible en* <http://indetectables.es/que-es-ser-indetectable>

⁸Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebas, pág. 21 *disponible en* https://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf

Como medida para solucionar la situación en la que nos encontramos las mujeres con vih/sida en Chile, es adoptar primeramente las medidas educativas y legislativas para impedir esta situación desproporcional de la mujer en la situación del uso del preservativo femenino, que este sea entregado de forma gratuita en los centros de salud pública, también se pide que el Estado parte se haga cargo de la salud física y psíquica de la mujer viviendo con vih/sida garantizando la educación familiar y comprensión adecuada de la maternidad de acuerdo a la situación específica de la mujer con este diagnóstico.

Sin más por el momento, les manifestamos las muestras de nuestro mayor respecto y quedamos atentas en caso necesiten más información sobre lo expuesto mediante la presente,